

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

海 芋(痕芋头)

Haiyu

本品为天南星科植物海芋 *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott 的干燥根茎。切块或片。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，略润，切厚片或宽丝(2~3mm)，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈不规则的片状或宽丝状，卷曲或皱缩，表面棕黄色，有的有残存鳞叶，切面白色或黄白色，有颗粒状突起及波状皱纹。质脆，易折断，富粉性。气微，味淡，嚼之麻舌而刺喉。

【检查】 杂质 不得过 2% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX A)。

【性味】 辛，寒；有毒。

【功能与主治】 清热解毒，消肿散结。用于热病高热，肠伤寒；外治疗疮肿毒。

【用法与用量】 9~30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【注意】 本品有毒，内服须先煎 2 小时。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

狼 毒

Langdu

本品为大戟科植物狼毒大戟 *Euphorbia fischeriana* Steud. 或月腺大戟 *Euphorbia ebracteolata* Hayata 的干燥根。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片，直径约 3cm。表面灰棕色，可层层剥离。切面具黄白色与棕黄色或棕褐色错综相间的花纹，有的略呈环纹或环状排列，并有众多裂隙和小孔。体轻，质松。气微，味麻辣。

【鉴别】 (1) 月腺大戟 粉末黄白色，淀粉粒甚多，单粒球形，长圆形或半圆形，直径 3~34 μ m，脐点裂缝状、人字状或星状，大粒层纹隐约可见；复粒由 2~5 粒组成；半复粒易见，网状具缘纹孔导管 18~80 μ m。无节乳管多碎断。所含的油滴状分泌物散在，有时可见乳管内充满黄色分泌物。

狼毒大戟 粉末黄棕色。淀粉粒单粒直径至 24 μ m，复粒由 2~7 粒组成，半复粒少见；网状具缘纹孔导管直径 102 μ m；乳汁无色。

(2) 取本品粗粉约 4g，加乙醇 40ml，回流 1 小时，放冷、滤过，取滤液 20ml 置水浴上浓缩至干，加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取狼毒对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005 年版一部附录 VI B) 试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯(9:1) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以醋酐-硫酸(1:1) 溶液，于 105 $^{\circ}$ C 烘约 5 分钟。供试品色谱中在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的紫红色斑点。

【性味与归经】 辛，平；有毒。归脾、胃、大肠经。

【功能与主治】 逐水祛痰，破积杀虫。用于痰饮积滞，心腹疼痛，咳逆气喘。

【用法与用量】 1~3g；外用适量。

【注意】 (1) 本品不宜与密陀僧同用。

(2) 狼毒系毒性中药，应遵照《医疗用毒性药品管理办法》的有关规定使用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

珠 子 参

Zhuzishen

本品为五加科植物珠子参 *Panax japonicus* C. A. Mey. var. *major* (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng 或羽叶三七 *Panax japonicus* C. A. Mey. var. *bipinnatifidus* (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng