

## 红大戟

Hongdaji

本品为茜草科植物红大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel et Pitard 除去须根的干燥块根。

【习用名称】 红毛大戟、红芽大戟。

【处方应配】 写大戟付红大戟。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片，直径0.5~1.2cm。表面棕红色至深红棕色，有深沟纹。切面棕黄色至棕红色，可见放射状纹理及深色环纹。质坚实。气微，味甜、微辛。

【鉴别】 (1)取本品粉末1g，置试管中，加水10ml，煮沸10分钟，滤过，滤液加氢氧化钠试液1滴，显樱红色，再加盐酸酸化后，变为橙黄色。

(2)取本品粉末3g，加甲醇30ml，浸渍1小时，滤过，滤液蒸干，加水10ml使溶解，再加盐酸1ml，加热回流30分钟，立即冷却，用三氯甲烷振摇提取2次，每次20ml，合并三氯甲烷液，蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取红大戟对照药材3g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录VI B)试验，吸取上述两种溶液各5 $\mu$ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚(30~60 $^{\circ}$ C)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置氨蒸气中熏后，日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【性味与归经】 苦，寒；有小毒。归肺、脾、肾经。

【功能与主治】 泻水逐饮，攻毒消肿散结。用于胸腹积水，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。

【用法与用量】 1~3g。

【注意】 (1)本品不宜与甘草同用。

(2)孕妇忌服。

【贮藏】 置干燥处。

## 红木香

Hongmuxiang

本品为木兰科植物南五味子 *Kadsura longipedunculata* Finet et Gagnep.的干燥根。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片，直径0.3~2.5cm。表面灰棕色至紫棕色，具纵皱纹。切面皮部宽红棕色，木部淡红棕色，可见众多圆形细孔，皮部易与木部分离，有的可见深过木部的横裂纹。质坚硬。气微香而特异，味微甜，后苦而辛。

【鉴别】 本品粉末深棕色。石细胞形大，多分枝呈不规则形，淡黄色，壁极厚，胞腔细小或不明显，外壁嵌有多数直径3~8 $\mu$ m的草酸钙方晶。纤维较多，长梭形，多碎断，直径16~57 $\mu$ m，壁极厚，木化，多数纤维外壁亦嵌有细小草酸钙方晶。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 祛风活血，理气止痛。用于脘腹胀痛，风湿痹痛，经行腹痛，跌扑伤痛。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

## 红参

Hongshen

本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey.的栽培品经蒸制后的干燥根及根茎。侧根或须根称红参须，根茎(芦头)称红参芦。

【炮制】 **红参片** 将原药烘软，除去芦头及须根，横切薄片。

**红参须** 将侧根或须根整理，除去杂质。

**红参芦** 将根茎除去杂质，筛去灰屑。