

【用法与用量】 15~30g; 先煎 2 小时。外用适量。

【注意】 本品有毒, 应在医生指导下使用。

【贮藏】 置干燥处, 防蛀。

野 薔 薇 根

Ye qiangweigen

本品为蔷薇科植物野蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb. 或小果蔷薇 *Rosa cymosa* Tratt. 除去须根的干燥根。

【习用名称】 白残花根。

【炮制】 将原药除去杂质, 分档, 洗净, 润透, 切薄片, 干燥, 筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则形或类圆形的切片, 直径 0.5~2cm。表面棕色至深棕色, 具纵皱纹, 有时可见须根痕。切面淡黄棕色至淡棕色, 类圆形者可见放射状纹理。质坚硬。气微, 味淡。

【性味与归经】 苦、涩, 凉。归脾、胃、肾经。

【功能与主治】 祛除风湿, 活血通络, 缩尿, 敛疮。用于风湿痹痛, 半身不遂, 尿频遗尿, 烫伤。

【用法与用量】 9~15g; 外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

银 柴 胡

Yinchaihu

本品为石竹科植物银柴胡 *Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bge. 除去残茎、须根的干燥根。

【炮制】 银柴胡 将原药除去残茎等杂质, 略浸, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥, 筛去灰屑。

炒银柴胡 将银柴胡照清炒法(附录 I)清炒至微具焦斑, 筛去灰屑。

鳖血拌银柴胡 将银柴胡用鳖血、黄酒的混合

液拌匀, 使至吸尽, 晒干。

每银柴胡 100g, 用鲜鳖血 13g, 黄酒 25g。

【性状】 银柴胡 本品呈类圆形或不规则形的片状, 直径 0.2~2.5cm。表面浅棕黄色至浅棕色, 具纵皱纹, 有明显或不明显的空穴状、盘状凹陷(俗称“砂眼”); 有的可见支根痕或密集的呈疣状突起的芽苞、茎或根茎的残基(习称“珍珠盘”)。切面黄白色至淡黄色, 皮部甚薄, 木部宽, 有黄、白色相间的放射状纹理。气微, 味微甜。

炒银柴胡 表皮棕黄色, 切面淡黄色至黄色, 可见焦斑, 具焦香气。

鳖血拌银柴胡 色泽较深, 微具腥臭。

【鉴别】 银柴胡 炒银柴胡 (1) 取本品粉末 1g, 加无水乙醇 10ml, 浸渍 15 分钟, 滤过。取滤液 2ml, 置紫外光灯(365nm)下观察, 显亮蓝微紫色的荧光。

(2) 取本品粉末 0.1g, 加甲醇 25ml, 超声处理 10 分钟, 滤过, 滤液置 50ml 量瓶中, 加甲醇至刻度。照紫外-可见分光光度法(《中国药典》2005 年版一部附录 V A)测定, 在 270nm 波长处有最大吸收。

【检查】 酸不溶性灰分 不得过 4.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的冷浸法(《中国药典》2005 年版一部附录 X A)测定, 用甲醇作溶剂, 不得少于 18.0%。

【性味与归经】 甘, 微寒。归肝、胃经。

【功能与主治】 清虚热, 除疳热。用于阴虚发热, 骨蒸劳热, 小儿疳热。本品炒用减弱其寒性, 鳖血拌用增强养阴退热作用。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置干燥处, 防蛀。鳖血拌银柴胡置阴凉干燥处, 防霉, 防蛀。

麻 黄 根