

雷公藤

Leigongteng

本品为卫矛科植物雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f. 根的干燥木部。

【炮制】 将原药除尽残留皮部及其它杂质。洗净，润软，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形薄片，直径 0.5~2cm，表面可见纵向略扭曲的沟槽。切面黄褐色，纹理细腻，可见细管。质坚硬。气微，味微苦。

【性味】 苦、涩、温。有毒。

【功能与主治】 杀虫，消炎，解毒。用于治疗类风湿性关节炎，白塞氏病，麻风反应，急性炎性，反应性皮肤病及自身免疫性疾病。

【用法与用量】 4.5~9g。

【注意】 本品有毒，内服宜慎。心、肝、肾、胃有疾患者及严重贫血、孕妇、哺乳期妇女等不宜服用。

【贮藏】 置干燥处。

蜘蛛香(缬草)

Zhizhuxiang

本品为败酱科植物心叶缬草 *Valeriana jatamansi* Jones 的根茎及根。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈片状，直径 0.5~2cm。根茎表面暗棕色或灰棕色，有密集隆起的环节及突起的点状根痕，有的顶端略膨大，有茎叶残基。切面灰棕色，可见筋脉点。根表面灰棕色有纵皱纹，质硬脆。具有特异臭气，味微苦辛。

【鉴别】 取本品粉末 1g，加三氯甲烷 10ml，振摇 5 分钟，滤过，滤渣再加 3ml 三氯甲烷洗涤，洗液和滤液合并，置水浴上蒸干，残渣加甲醇 1ml 溶解，滤过。取 0.5ml 滤液，加冰醋酸-盐酸(1:1)

混合液 1ml，振摇数分钟或水浴上加热 5 分钟，溶液呈深蓝色。

【性味】 辛、微苦，温。

【功能与主治】 理气止痛，消炎止泻，祛风除湿，镇静安神。用于脘腹胀痛，消化不良，痢疾，风湿痹痛，腰膝酸软，失眠。

【用法与用量】 3~6g。

【贮藏】 置干燥处。

酸模

Suanmo

本品为蓼科植物酸模 *Rumex acetosa* L. 的干燥根及根茎。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，略润，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈类圆形的片状，直径 1~6mm。表面棕紫色或棕红色，有细纵皱纹。切面棕黄色。质脆。气微，味微苦而涩。

【鉴别】 取本品粉末 0.1g，置具塞锥形烧瓶中，加乙醚 10ml，浸渍 10 分钟，时时振摇，滤过。取滤液加氢氧化钠试液 2ml，振摇，氢氧化钠液层显红色。

【性味】 酸，寒。

【功能与主治】 清热，利尿，凉血，杀虫。用于热痢，淋病，小便不通，吐血，恶疮，疥癣。

【用法与用量】 10~15g。外用适量，捣敷。

【贮藏】 置干燥处。

薏苡根

Yiyigen

本品为禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 的干燥根及根茎。

【习用名称】 米仁根、佛珠根。

【炮制】 将原药除去残茎等杂质，洗净，切短段，干燥，筛去灰屑。