释至刻度,摇匀,即得(每1ml含五味子醇甲0.3mg)。

供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约 0．25g，精密称定，置 20ml 量瓶中，加甲醇约 18ml，超声处理(功率 250W，频率 20kHz)20 分钟，取出，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品含五味子醇甲($C_{24}H_{32}O_7$)不得少于 0.30%。

【性味与归经】 酸，甘、温。归肺、心、肾经。

【功能与主治】 收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。

【用法与用量】 1.5～6g。

【贮藏】 置干燥处。

六 轴 子

Liuzhouzi

本品为杜鹃花科植物羊踯躅 *Rhododendron molle* G. Don 的干燥成熟果实。

【习用名称】 八厘麻。

【炮制】 将原药除去果柄等杂质，筛去灰屑。

【性状】本品呈长椭圆形,有的略弯曲,长 2～3cm，直径 0.7～1cm。表面红棕色至棕褐色，稍具光泽，有纵沟 5 条，顶端尖，多已开裂，果瓣接合面淡棕色，中轴呈五角棱柱状，基部具果柄痕，有的可见具短柔毛的残存宿萼。质坚脆，易折断。种子多数，扁平，略呈椭圆形，长约 4mm，棕褐色，周围具膜质翅。气微，味涩、微苦，有刺舌感。

【性味】 苦、辛，温；有毒。

【功能与主治】 活血散瘀，镇痛。用于风湿痹痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 0.3～1g。

【注意】 (1)本品系毒性中药，应遵照《医疗用毒性药品管理办法》的有关规定使用。

(2)本品易使心率减慢，血压下降；孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处。

凤 眼 草

Fengyancao

本品为苦木科植物臭椿 *Ailanthus altissima*（Mill.）Swingle 的干燥成熟果实。

【炮制】 将原药除去残留果柄等杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品为翅果,呈纺锤状,扁平,长 3～5cm,宽 0.8～1.5cm。表面淡黄棕色至黄棕色，微有光泽，可见纵向脉纹，中央呈扁球形突起，内有种子 1 粒。种子扁平，类心形，种皮黄褐色，子叶 2 片，黄绿色，富油性。质脆。气微，种子味苦。

【性味】 苦、涩，寒。

【功能与主治】 清热燥湿，涩肠止泻，止带，止血。用于痢疾，便血，白带。

【用法与用量】 3～9g。

【贮藏】 置干燥处。

分 心 木

Fenxinmu

本品为胡桃科植物胡桃 *Juglans regia* L. 果核的干燥木质隔膜。

【习用名称】 胡桃隔、胡桃夹、核桃夹、核桃隔。

【炮制】 将原药除去硬壳、残留核桃仁等杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品多破碎成半圆形片状或不规则片状，完整者呈类圆形或椭圆形，直径 2.5～3cm，表面棕色至浅棕褐色，稍有光泽，边缘不整齐，上中部有一卵圆形或椭圆形孔洞，长约占隔膜直径的