

质脆。气辛香，味辛辣、麻舌。

蜜炙细辛 黄褐色，滋润，味微甜。

【检查】细辛 杂质 不得过 3%（《中国药典》2005 年版一部附录 IX A）。

总灰分 不得过 12.0%（《中国药典》2005 年版一部附录 IX K）。

【含量测定】细辛 照挥发油测定法（《中国药典》2005 年版一部附录 X D）测定。

本品含挥发油不得少于 1.6%（ml/g）。

【性味与归经】 辛，温。归心、肺、肾经。

【功能与主治】 祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。本品蜜炙用减少温散之性。

【用法与用量】 1~3g；外用适量。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置干燥处。

软 柴 胡

Ruanchaihu

本品为伞形科植物狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 带幼苗的干燥根。

【习用名称】 细柴胡、春柴胡。

【炮制】软柴胡 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

炒软柴胡 将南柴胡，照清炒法（附录 I）炒至微具焦斑，筛去灰屑。

鳖血拌软柴胡 将南柴胡用鲜鳖血、黄酒的混合液拌匀，使之吸尽，干燥。

每南柴胡 100g，用鲜鳖血 13g，黄酒 25g。

【性状】软柴胡 本品呈段状。根为类圆柱形，直径 3~6mm，表面灰棕色至棕褐色，具纵皱纹，有的可见支根痕及横环纹。切面皮部狭，淡黄棕色，木部宽，黄白色，常有裂隙。茎少数，细柱形，直径 1~2mm，具纵棱线。叶暗绿色，具数条平行叶脉。体轻，质脆。气微，味微涩、微苦。

炒软柴胡 色泽较深，有的具焦斑，微具焦香气。

鳖血拌软柴胡 色泽较深，微具腥臭。

【鉴别】软柴胡 取本品粉末 0.5g，加甲醇 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液浓缩至约 5ml，作为供试品溶液。另取柴胡对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。再取柴胡皂苷 a 对照品、柴胡皂苷 d 对照品，加甲醇制成每 1ml 各含 0.5mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005 年版一部附录 VI B）试验，吸取上述三种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-乙醇-水（8：2：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2% 对二甲氨基苯甲醛的硫酸溶液（4 \rightarrow 10），在 60 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰，置日光及紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材及对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2005 年版一部附录 IX K）。

【性味与归经】 苦、平，微寒。入肝、胆经。

【功能与主治】 和解退热，疏肝解郁。用于伤寒，寒热往来，疟疾，胸闷胁痛，月经不调。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置干燥处。

前 胡

Qianhu

本品为伞形科植物白花前胡 *Peucedanum praeruptorum* Dunn 除去须根的干燥根。

【习用名称】 信前胡、粉前胡、嫩前胡。

【处方应配】 写炙前胡付蜜前胡。

【炮制】前胡 将原药除去枯茎等杂质，洗净，润透，切厚片，晒或低温干燥，筛去灰屑。

蜜前胡 取前胡，照蜜炙法（附录 I）炒至蜜汁吸尽不粘手。