

(3)孕妇忌用；生品内服宜慎。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

备注：本市习惯将乌头 *Acoilitum carmichaeli* Debx. 野生品的干燥母根及少量子根作草乌用。

草 石 蚕

Caoshican

本品为骨碎补科植物圆盖阴石蕨 *Humata tyermanni* Moore 的干燥根茎。

【习用名称】 干石蚕。

【处方应配】 写石蚕付草石蚕。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈扁圆柱形的段状，有的弯曲，直径4~8mm。表面黄棕色至褐棕色，具纵皱纹、须根痕及众多毛孔样小点，有的残留灰棕色至棕色鳞片。切面红棕色至褐棕色，散有筋脉小点。质坚脆。气微，味微涩。

【性味与归经】 甘、淡，凉。归脾、肝经。

【功能与主治】 祛风除湿，活血解毒。用于风湿痹痛，跌打损伤，湿热黄疸，牙龈肿痛，肺痈乳痈，外治疮疖。

【用法与用量】 3~9g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

香 附

Xiangfu

本品为莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的根茎，燎去毛须，略煮或蒸透，干燥。

【处方应配】 写香附、炒香附均付制香附。

【炮制】 生香附 将原药除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

制香附 将原药除去杂质。略浸，洗净，置锅内，加黄酒、米醋和水适量与香附成平面，用文火

煮透，至汁吸尽。置蒸具内，蒸至外黑内深褐色，晒至外干内润，切薄片，再将蒸时所得汁水拌入，使之吸尽，干燥，筛去灰屑。

每生香附 100kg，用黄酒 10kg，米醋 10kg。

【性状】 生香附 本品为类圆形或不规则形的切片，直径0.4~1cm。表面棕褐色至黑褐色，具纵皱纹，有的可见残留须根痕、横环节及残留棕色毛须。切面黄棕色、红棕色或类白色，淡棕色者可见筋脉点及筋脉纹，具1环纹细而明显。质硬或坚脆，略带角质样或粉性，气香，味微苦。

制香附 本品为类圆形或不规则形的切片，直径0.3~0.9cm。全体呈乌黑色，表面可见纵皱纹，有的可见残留须根痕及横环节。质坚硬。折断面深褐色，具光泽。气微，味微苦。

【鉴别】 生香附 (1) 本品粉末浅棕色。分泌细胞类圆形，直径35~72 μ m，内含淡黄棕色至红棕色分泌物，其周围5~8个细胞作放射状环列。表皮细胞多角形，常带有下皮纤维及厚壁细胞。下皮纤维成束，深棕色或红棕色，直径7~222 μ m，壁厚。厚壁细胞类方形、类圆形或形状不规则，壁稍厚，纹孔明显。石细胞少数，类方形、类圆形或类多角形，壁较厚。

(2) 生香附 取本品粉末1g，加乙醚5ml，放置1小时，时时振摇，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取 α -香附酮对照品，加乙酸乙酯制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录VI B)试验，吸取上述两种溶液各10 μ l，分别点于同一硅胶GF₂₅₄薄层板上，以苯-乙酸乙酯-冰醋酸(92:5:5)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的深蓝色斑点；喷以二硝基苯肼试液，放置片刻，斑点渐变为橙红色。

【检查】 杂质 不得过2%(《中国药典》2005年版一部附录IX A)。