

喉。

【用法与用量】 6~9g。

【贮藏】 置干燥处。

### 枸杞根

Gouqigen

本品为茄科植物枸杞 *Lycium chinense* Mill. 的干燥根。

【习用名称】 杞子根。

【炮制】 将原药除去杂质，分档，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片，直径0.5~4cm。表面灰黄色至棕黄色，粗糙，有的可见裂纹或外皮已脱落。切面皮部窄，棕褐色，木部黄色，可见多列同心性环纹，中心常有圆形棕色小孔。质坚硬。气微，味淡。

【性味】 甘、淡，寒。

【功能与主治】 祛风，清热。用于关节疼痛，低热。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

### 枸骨根

Gougugen

本品为冬青科植物枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. ex Paxt. 的干燥根。

【习用名称】 功劳根、雀不踏根。

【处方应配】 写枸骨付枸骨根。

【炮制】 将原药除去杂质，分档，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则形或类圆形的切片，直径0.8~2.5cm。外皮多数已脱落，残存者呈灰黄棕色至灰褐色。切面黄白色，较平坦，类圆形者有

的可见细密的放射状纹理及多列同心性环纹。质坚硬。气微，味淡，味微苦。

【性味】 微苦，凉。

【功能与主治】 益肝肾，祛风湿，散风热。用于腰膝痿弱，风湿痛，牙痛，赤眼，流火。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

### 独活

Duhuo

本品为伞形科植物重齿毛当归 *Angelica pubescens* Maxim. f. *biserrata* Shan et Yuan 除去须根的干燥根。

【习用名称】 川独活、香独活。

【炮制】 将原药除去黑色油类等杂质，洗净，润透，切薄片，晒或低温干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则的切片，直径0.2~3cm。表面棕褐色或暗褐色，具纵皱纹，有的可见横长皮孔样突起及须根痕。切面灰黄色至黄棕色，散有众多棕色油点，并可见1轮或数轮棕色环纹及裂隙。气浓香特异，味苦、辛，略有麻舌感。

【鉴别】 取本品粉末2g，加乙醚10ml，浸渍过夜，滤过，滤液蒸干，残渣加三氯甲烷2ml使溶解，作为供试品溶液。另取独活对照药材2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005年版一部附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-苯-乙酸乙酯（2:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 杂质 不得过3%（《中国药典》2005年版一部附录IX A）。

总灰分 不得过8.0%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

【浸出物】 醚溶性浸出物（《中国药典》2005