

或放射状纹理，皮部淡黄白色、黄白色、灰白色至淡棕色，木部淡黄色。质稍硬或略带韧性。有特殊香气，味微甜。

**蜜麸炒党参** 淡棕黄色至棕黄色，略具焦香气。

**【鉴别】党参** 取本品粉末1g，加甲醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水2ml使溶解，置十八烷基硅烷键合硅胶柱（500mg，用甲醇、20%甲醇各10ml预洗）中，依次用20%甲醇、甲醇各5ml洗脱，收集甲醇洗脱液，浓缩至1ml，作为供试品溶液。另取党参炔苷对照品适量，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005年版一部附录VI B）试验，吸取供试品溶液6 $\mu$ l、对照品溶液2 $\mu$ l，分别点于同一高效硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（7：1：0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以硫酸乙醇溶液（1→10），105℃加热5分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

**【检查】杂质** 不得过2%（《中国药典》2005年版一部附录IX A）。

**【浸出物】党参** 照浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》2005年版一部附录X A）测定，用45%乙醇作溶剂，不得少于50.0%。

**【性味与归经】** 甘，平。归脾、肺经。

**【功能与主治】** 补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。麸炒增强健脾作用。

**【用法与用量】** 9~30g。

**【注意】** 不宜与藜芦同用。

**【贮藏】** 置干燥处，防蛀。

## 凌霄根

Lingxiaogen

本品为紫葳科植物凌霄 *Campsis*

*grandiflora* (Thunb.) K. Schum. 或美洲凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem. 的干燥根。

**【习用名称】** 紫葳根，凌霄花根。

**【炮制】** 将原药除去杂质，洗净，润软，切薄片，干燥，筛去灰屑。

**【性状】** 本品呈类圆形或不规则形的片状，直径1~3cm。表面土黄色或土红色，有纵皱纹，有的可见支根或支根的断痕。切面皮部棕色，木部淡黄色，纤维性。气微，味淡。

**【鉴别】** 本品横切面：木栓层中常有1~2层细胞微木化，栓内层狭窄，与韧皮部界限不明显。韧皮部宽广，内侧散在韧皮纤维。形成层多成环。木质部导管单个或2~3个相聚，直径可达90 $\mu$ m，射线1~2列细胞。

**【性味】** 甘、酸，寒。

**【功能与主治】** 凉血，祛风，行瘀。用于血热生风，身痒，腰脚不遂，痛风。

**【用法与用量】** 6~9g。

**【贮藏】** 置干燥处。

## 射干

Shegan

本品为鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 除去须根的干燥根茎。

**【习用名称】** 乌扇。

**【炮制】** 将原药除去残茎等杂质，适当水浸，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

**【性状】** 本品呈不规则的片状，边缘多凹陷与缺刻。表面黄褐色、棕褐色至黑褐色，皱缩，具残留的须根及须根痕，有的可见细密环纹。切面淡黄色至鲜黄色，具散在的筋脉小点或筋脉纹，有的可见环纹。质坚硬，折断面颗粒性。气微，味苦、微辛。

**【鉴别】** (1) 本品粉末橙黄色。草酸钙柱晶较多，棱柱形，多已破碎，完整者长49~240(315) $\mu$ m，