

【用法与用量】 3~6g, 通常炮制后用; 生品, 外用适量, 原个者用时捣碎, 熬膏或碾末以酒调敷患处。

【注意】 (1) 生禹白附系毒性中药, 应遵照《医疗用毒性药品管理办法》的有关规定使用。

(2) 孕妇慎服; 生品内服宜慎。

【贮藏】 置干燥处, 生品防蛀。

禹州漏芦

YuzhouLoulu

本品为菊科植物蓝刺头 *Echinops latifolius* Tausch. 或华东蓝刺头 *Echinops grijisii* Hance 除去须根的干燥根。

【炮制】 将原药除去残茎等杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥, 筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的片, 直径 0.5~1.5cm。表面灰黄色至灰褐色, 具纵皱纹, 有的茎有残存的棕色纤维状硬毛。切面皮部褐色, 木部呈黄黑相间的放射状纹理。质稍坚。气微, 味微涩。

【鉴别】 本品粉末棕黄色。韧皮纤维多成束, 直径 20~42 μm , 壁厚。细胞间隙有棕褐色树脂状物。木纤维细长, 两端渐尖, 直径 12~30 μm , 壁较厚。具缘纹孔及网纹导管较多见, 直径 20~120 μm 。石细胞少见, 类圆形、长方形或方形, 直径 35~150 μm , 层纹及孔沟明显, 细胞间隙有棕褐色树脂状物。可见菊糖。

【检查】杂质 不得过 3% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX A)。

总灰分 不得过 8.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

酸不溶性灰分 不得过 4.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的热浸法 (《中国药典》2005 年版一部附录 X A) 测定, 用

稀乙醇作溶剂, 不得少于 11.0%。

【性味与归经】 苦, 寒。归胃经。

【功能与主治】 清热解毒, 排脓止血, 消痈下乳。用于诸疮痈肿, 乳痈肿痛, 乳汁不通, 瘰疬疮毒。

【用法与用量】 3~9g。

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 置干燥处, 防霉。

备注: 本市处方中药名“漏芦”习惯付“禹州漏芦”。

穿山龙

Chuanshanlong

本品为薯蓣科植物穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* Makino 的干燥根茎。

【炮制】 将原药除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥, 筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形的片, 直径 1.0~1.5cm。表面黄白色或棕黄色, 有不规则纵沟、刺状残根及偏于一侧的突起茎痕。切面白色或黄白色, 散有淡棕色维管束小点。质坚硬。气微, 味苦涩。

【鉴别】 本品粉末淡黄色。淀粉粒单粒椭圆形、类三角形、圆锥形或不规则形, 直径 3~17 μm , 长至 33 μm , 脐点长缝状。草酸钙针晶散在, 或成束存在于黏液细胞中, 长约至 110 μm 。木化薄壁细胞淡黄色或黄色, 呈长椭圆形、长方形或棱形, 纹孔较小而稀疏。具缘纹孔导管直径 17~56 μm , 纹孔细密, 椭圆形。

【检查】总灰分 不得过 5.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

酸不溶性灰分 不得过 1.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

【性味】 甘、苦, 温。

【功能与主治】 祛风湿, 止痛, 舒筋活血, 止咳平喘祛痰。用于风湿性关节炎, 腰腿疼痛、麻