

Jinquegen

本品为豆科植物锦鸡儿 *Caragana sinica* (Buc' hoz) Rehd. 除去须根的干燥根。

【习用名称】 阳雀花根、金雀藤、锦鸡儿。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，中途淋水，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形的切片，直径0.5~1.5cm。表面黄棕色至棕褐色，具纵沟纹和须根痕，有时可见横向皮孔，外皮较易脱落。切面淡黄色至淡黄棕色，环纹明显。质坚。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

【性味与归经】 甘，微温。归肺、脾经。

【功能与主治】 祛风湿，活血。用于风湿痹痛，跌扑损伤，体虚浮肿，胃热咳嗽，白带。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置干燥处。

金 樱 子 根

Jinyingzigen

本品为蔷薇科植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的干燥根。

【习用名称】 金樱根、野石榴根。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈不规则形或类圆形的片状，直径1~5cm。表面棕褐色至红棕色，具纵皱纹。切面皮部狭窄，棕红色至棕色，有的层层分离；木部宽，棕黄色至淡棕色，具放射状纹理，有的可延伸至皮部，并有众多细孔，有时见有数轮环纹。质坚硬。气微，味微苦涩。

【鉴别】 (1)取本品粉末5g，加水50ml，置60℃水浴上加热15分钟，滤过。取滤液1ml，加碱性酒石酸铜试液4~5滴，在水浴上加热15分钟，生成红棕色沉淀；另取滤液1ml，加1%三氯化铁溶液1~

2滴，即显暗紫色。

(2)取【鉴别】(1)项下剩余的滤液2ml，置具塞试管中，用力振摇1分钟，发生大量蜂窝状泡沫，放置10分钟，泡沫无明显消失。

【检查】 杂质 不得过2% (《中国药典》2005年版一部附录IX A)。

【性味与归经】 酸、涩，平。归脾、肝、肾经。

【功能与主治】 收敛固涩，活血止泻。用于跌扑损伤，腰膝酸痛，遗精遗尿，久泻，带下，子宫下垂。

【用法与用量】 9~15g；外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

细 辛

Xixin

本品为马兜铃科植物北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq. var. *seoulense* Nakai 或华细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 的干燥(阴干)根及根茎。

【习用名称】 北细辛。

【处方应配】 写炙细辛、蜜细辛均付蜜炙细辛。

【炮制】 细辛 将原药除去杂质，洗净，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。

蜜炙细辛 取细辛，照蜜炙法(附录I)用炼蜜拌炒至蜜汁吸尽。

每细辛100kg，用炼蜜20kg。

【性状】 细辛 本品呈段状。根段细长圆柱形，直径约1mm；表面灰黄色至灰褐色，平滑或具纵皱纹，可见须根及须根痕；切面黄白色或白色。根茎段呈不规则结节状或圆柱形结节状，直径1~5mm；表面灰棕色，粗糙，可见环形的节、叶柄痕及根痕，节长1~10mm，有的有分枝；切面黄白色或白色。