【习用名称】 大红枣、红枣。

【**处方应配**】 写大枣一只付大枣 3g。

【**炮制**】 将原药除去黑色烂只等杂质,快洗, 及时干燥。

【性状】本品呈椭圆形或球形,长 2~3.5cm, 直径 1.5~2.5cm。表面暗红色,略带光泽,有不规则皱纹。基部凹陷,有时可见短果梗。外果皮薄, 中果皮棕黄色或淡褐色,肉质,柔软,富糖性而油润。果核纺锤形,两端锐尖,质坚硬。气微香,味甜。

【鉴别】 取本品粉末 2g,加石油醚(60~90℃)10ml 浸泡 10分钟,超声处理约 10分钟,滤过,弃去石油醚液,药渣晾干,加乙醚 20ml,浸泡 1小时,超声处理约 15分钟,滤过,滤液浓缩至 2ml,作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品,加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005 年版一部附录VI B)试验,吸取供试品溶液 10μl、对照品溶液 3μl,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸(14:4:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以硫酸乙醇溶液(1→10),加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【**检查**】 **总灰分** 不得过 2.0% (《中国药典》 2005 年版一部附录IX K)。

【性味与归经】 甘,温。归脾、胃经。

【功能与主治】 补中益气,养血安神。用于 脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。

【用法与用量】 $6\sim15$ g。煎时破开或去核。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防蛀。

大 腹 毛

Dafumao

本品为棕榈科植物槟榔 Areca catechu L. 的干燥成熟果皮。打松,晒干。

【习用名称】 大腹皮、大腹绒、槟榔皮。

【**处方应配**】 写大腹皮、大腹绒、槟榔皮均付 大腹毛。

【**炮制**】 将原药除去杂质,洗净,干燥,筛去 灰屑。

【性状】 本品略呈椭圆形或瓢状。外果皮多已脱落或残存。中果皮棕毛状,黄白色或淡棕色,疏松质柔。内果皮硬壳状,黄棕色至棕色,内表面光滑,有时纵向破裂。气微,味淡。

【鉴别】本品粉末黄白色或黄棕色。中果皮纤维成束,细长,直径8~15µm,微木化,纹孔明显,周围细胞中含有圆簇状硅质块,直径约8µm。内果皮细胞呈不规则多角形、类圆形或椭圆形,直径48~88µm,纹孔明显。

【性味与归经】 辛,微温。归脾、胃、大肠、 小肠经。

【功能与主治】 下气宽中,行水消肿。用于湿阻气滞,脘腹胀闷,大便不爽,水肿胀满,脚气浮肿,小便不利。

【用法与用量】 4.5~9g。

【贮藏】 置干燥处。

女 贞 子

Nüzhenzi

本品为木犀科植物女贞*Ligustrum lucidum* Ait. 直接干燥或经稍蒸或置沸水略烫后干燥的成熟果实。

【习用名称】 冬青子。

【**处方应配**】 写女贞子、炙女贞子均付制女贞子。

【炮制】 制女贞子 将原药除去杂质,淘净,置蒸具内,上汽后蒸4小时,焖过夜,至色泽乌黑,干燥,筛去灰屑。

【性状】 本品呈卵形、椭圆形或肾形,长6~8.5mm,直径3.5~5.5mm。表面乌青色至黑色,皱缩,果皮易碎,内核较硬,棕黑色,具纵棱,破开后种子