

液各10μl, 注入液相色谱仪, 测定, 即得。

生何首乌 含2, 3, 5, 4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D葡萄糖苷 (C₂₀H₂₂O₉) **生何首乌** 不得少于0.90%, **制何首乌** 按干燥品计算, 不得少于0.70%。

【性味与归经】 苦、甘、涩, 温。归肝、心、肾经。

【功能与主治】 **鲜何首乌** 润肠通便作用较强。

生何首乌 解毒消痈, 润肠通便。用于瘰疬疮痍, 风疹瘙痒, 肠燥便秘, 高血脂。

制何首乌 补肝肾, 益精血, 乌须发, 强筋骨。用于血虚萎黄, 眩晕耳鸣, 须发早白, 腰膝酸软, 肢体麻木, 崩漏带下, 久疟体虚症, 高血脂。

【用法与用量】 6~12g; **鲜何首乌** 15~30g。

【贮藏】 置干燥处, 防蛀; 鲜何首乌置阴凉处或埋泥沙中。

岗 稔 根

Gangrengen

本品为桃金娘科植物桃金娘 *Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk. 的干燥根。

【习用名称】 山稔根、桃金娘根。

【炮制】 将原药除去杂质, 洗净, 打丝, 或润透, 切厚片, 干燥, 筛去灰屑。

【性状】 本品呈不规则形的片状或丝条状。表面灰棕色至黑褐色, 粗糙, 易脱落, 外皮脱落处呈赭红色至棕红色, 具纵纹。切面浅棕色, 有时可见同心环纹(老根)。质硬而致密, 不易折断。气微, 味涩。

【性味与归经】 甘、涩, 平。归肝, 脾经。

【功能与主治】 祛风通络, 止血止痛。用于崩漏, 风湿痹痛, 腰肌劳损。

【用法与用量】 9~30g。

【贮藏】 置干燥处。

羌 活

Qianghuo

本品为伞形科植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 *Notopterygium forbesii* de Boiss. 除去须根的干燥根茎及根。

【习用名称】 川羌活。

【炮制】 将原药除去残茎等杂质, 快洗, 润透, 切厚片, 晒或低温干燥, 筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片, 直径0.6~3cm。表面棕褐色至黑褐色, 外皮脱落处呈黄色, 有的可见紧密隆起的横纹、纵皱纹或皮孔。切面黄棕色至棕色, 具裂隙, 有朱砂点(油点), 木部黄白色, 呈菊花心状, 有的具黄色至黄棕色的髓部。质较松而易碎。气香, 味微苦而辛或较淡。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的热浸法(《中国药典》2005年版一部附录X A)测定, 用乙醇作溶剂, 不得少于15.0%。

【含量测定】 照挥发油测定法(《中国药典》2005年版一部附录X D)测定。

本品含挥发油不得少于2.0%(ml/g)。

【性味与归经】 辛、苦, 温。归膀胱、肾经。

【功能与主治】 散寒, 祛风, 除湿, 止痛。用于风寒感冒头痛, 风湿痹痛, 肩背酸痛。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置阴凉干燥处, 防蛀、防霉。

芦 根

Lugen

本品为禾本科植物芦苇 *Phragmites communis* Trin. 除去芽、须根及膜质叶鞘的新鲜或干燥根茎。

【习用名称】 苇根、苇茎。

【处方应配】 写芦根付干芦根; 写鲜芦根 1 支付鲜芦根 30g; 写芦根 1 支付干芦根 15g。

【炮制】 **鲜芦根** 用时将原药洗净, 切段。

干芦根 将原药除去杂质, 洗净, 润软, 切长段, 干燥, 筛去灰屑。