

**【用法与用量】** 3~9g; 研粉吞服, 一次 1~3g。  
外用适量。

**【注意】** 孕妇慎用。

**【贮藏】** 置干燥处, 防蛀。

### 三 棱

Sanleng

本品为黑三棱科植物黑三棱 *Sparganium stoloniferum* Buch. -Ham. 除去外皮的干燥块茎。

**【习用名称】** 山棱、京三棱、荆山棱。

**【炮制】** 将原药除去杂质, 分档, 洗净, 浸泡, 润透, 切薄片或蒸具内蒸热(蒸的时间不能过长, 以防变色), 趁热切薄片, 干燥, 筛去灰屑。

**【性状】** 本品为类圆形或椭圆形的切片, 直径 1.0~4cm。表面黄白色或灰黄色, 残留外皮呈棕褐色至灰褐色, 有的可点状须根痕。切面淡黄色至淡灰棕色, 具不明显散在的筋脉小点及筋脉纹。体重质坚, 嚼之微有麻舌感。气微, 味淡。

**【鉴别】** 取本品粉末 2g, 加乙醇 30ml, 加热回流 1 小时, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加乙醇 2ml 使溶解, 作为供试品溶液。另取三棱对照药材 2g, 同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005 年版一部附录 VI B) 试验, 吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l, 分别点于同一硅胶 G 薄层板上, 以环己烷-乙酸乙酯(4:1) 为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以 10% 硫酸乙醇溶液, 在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

**【检查】总灰分** 不得过 3.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

**【浸出物】** 照浸出物测定法项下的热浸法(《中国药典》2005 年版一部附录 X A) 测定, 用稀乙醇作溶剂, 不得少于 6.0%。

**【性味与归经】** 辛、苦, 平。归肝、脾经。

**【功能与主治】** 破血行气, 消积止痛。用于

癥瘕痞块, 瘀血经闭, 食积胀痛。

**【用法与用量】** 3~9g。

**【注意】** (1) 本品不宜与银硝同用。

(2) 孕妇禁用。

**【贮藏】** 置干燥处, 防霉、蛀。

### 千 斤 拔

Qianjinba

本品为豆科植物蔓性千斤拔 *Flemingia philippinensis* Merr. et Rolfe 的干燥根。

**【炮制】** 将原药除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥, 筛去灰屑。如原药为斜切片则改刀切碎。

**【性状】** 本品为类圆形切片, 直径 0.2~2cm。表面粗糙, 具纵裂纹或裂隙, 有的可见木质部, 灰褐色至棕黑色, 有的可见环状皱纹或明显皮孔。切断面纤维性; 皮部红棕色, 易剥落; 木部黄白色, 并具放射状纹理。质坚硬。气微, 味淡。改刀片呈破碎状。

**【性味】** 甘、涩, 平。

**【功能与主治】** 舒筋壮骨, 敛肺清咽。用于腰肌劳损, 偏瘫痿痹, 风湿痛及肺虚久咳, 咽喉肿痛。

**【用法与用量】** 15~30g。

**【贮藏】** 置干燥处。

### 千 年 健

Qiannianjian

本品为天南星科植物千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott 除去外皮的干燥根茎。

**【炮制】** 将原药除去杂质, 分档, 洗净, 润透, 切薄片, 干燥, 筛去灰屑。

**【性状】** 本品呈类圆形或不规则形的片状, 直径 0.8~1.8cm。表面黄棕色至红棕色, 粗糙, 具